



## Verloop van de opnamedag

### Vorbereiding

U wordt samen met uw kind op het uur van de afspraak verwacht aan het onthaal van het ziekenhuis. Na het regelen van de administratieve zaken wordt u op de afdeling verwelkomd.

Hier zal een verpleegkundige u een kamer toewijzen en de formulieren voor de ingreep in orde brengen. Zij zal volgende zaken vragen en uitvoeren:

- u dient een vragenlijst in te vullen, alsook een toestemming voor narcose te ondertekenen (als dit nog niet gebeurd is)
- wegen van uw kind
- controle van de temperatuur (bij koorts of ziek zijn wordt een operatie soms uitgesteld)
- navraag of uw kind nuchter is
- er wordt een identificatiearmbandje rond de rechter pols gedaan
- er wordt een verdovende pleister aangebracht op de linkerhand of elleboogplooi. Deze zorgt ervoor dat de prik voor een infuus niet pijnlijk is.
- navraag of er briefjes voor school of werkverlet nodig zijn

Na deze handelingen kan uw kind het operatieschortje aandoen. Een onderbroekje of luier mag aangehouden worden. Vanaf dan is het wachten tot uw kind aan de beurt is. U kan deze tijd opvullen door uw kind speelgoed aan te bieden.

Een favoriete knuffel of een fopspeentje mogen eventueel mee naar het operatiekwartier.

Wanneer uw kind aan de beurt is, mag u meegaan totdat uw kind onder narcose is. Wanneer de operatieverpleegkundige uw kind komt halen, zal u voor even afscheid moeten nemen. U kan dan wachten in de hal of op de kamer.

### Operatie

Uw kind zal even onder narcose worden gebracht. Zodra uw kind slaapt zullen de amandelen operatief worden verwijderd door de arts. Hierna wordt uw kind stilaan terug wakker gemaakt en moet het nog even op de ontwaakzaal verblijven.

### Na de operatie

Na ongeveer een half uur komt uw zoon/dochter terug naar de kamer.

Het bloedverlies langs de neus of de mond zal gecontroleerd worden.

Schrik niet wanneer uw kind bloed braakt. Dit is oud bloed dat tijdens de operatie in de maag is terecht gekomen. Vaak klagen kinderen dan van buikpijn of misselijkheid.

Na ongeveer een uurtje krijgt uw kind water te drinken (of een flesje van thuis bij kleinere kinderen) en eventueel nadien nog een ijsje om de pijn te verzachten.

Wanneer uw kind heeft geplast en gedronken, zal het infuus verwijderd worden.

Wanneer de arts is langs geweest (meestal rond de middag), en wanneer er zich geen problemen stellen, mag u samen met uw kind naar huis.

De arts zal met u een afspraak maken om op controle te komen.

Beste ouder(s),

Vandaag wordt uw kind opgenomen in het ziekenhuis. De amandelen zullen operatief verwijderd worden bij uw kind. Deze brochure geeft u informatie over wat vooraf gaat aan de ingreep, de ingreep zelf en wat er achteraf nog gebeurt. Ook krijgt u informatie over het verdere verloop thuis.

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen? Aarzel dan niet om deze aan de verpleegkundige te stellen of neem contact op met het ziekenhuis op volgend telefoonnummer: 014 24 61 11

Zouden er zich toch medische problemen voordoen, dan zal de arts een overnachting in het ziekenhuis regelen.

### Mogelijke complicaties

Soms kan het zijn dat uw kind thuis terug begint te bloeden. Vooral bij helder rood bloed dient men onmiddellijk het ziekenhuis te contacteren.

Geef je kind dus enkele dagen voor de operatie en ook na de operatie geen aspirine. Deze beïnvloedt immers de bloedstolling waardoor men langer kan nabloeden.

### Wat dient er thuis te gebeuren?

De eerste dagen na de operatie zal uw kind zich nog ziek voelen en eventueel koorts maken. Als deze  $>38^{\circ}\text{C}$  is, dient u een koortswerend middel toe te dienen. De eerste dagen wordt zwemmen afgeraden. Vraag even na aan de arts hoelang.

### Eten en drinken

#### “ Drinken moet, eten mag”

Eten en drinken kan de eerste dagen een probleem geven omwille van pijn ter hoogte van de keel. Er kan een piek in de pijn ontstaan 4 à 5 dagen na de operatie. Geef uw kind tijdig pijnstillende medicatie. Spoor uw kind aan om zeker te drinken en zo mogelijk te eten.

Dit is van belang voor de genezing en zal eveneens de pijn verminderen.

Gemiddeld moet uw kind 1 liter vocht (Cola, melk, fristi, ijs,... ) binnen krijgen.

### Wat bij pijn?

GEEN aspirine (zoals Aspegic®)

WEL paracetamol (zoals Dafalgan®, Perdolan®, Curpol®)

Indien nodig is Nurofen® ook toegestaan.

Tegenwoordig heeft men beide pijnstillers onder alle vormen: poeder, pil, instant, suppo.

Bij blijvende problemen (koorts, pijn, bloeding) contact opnemen met:

- of de behandelende arts
- of de huisarts
- of het ziekenhuis

### Telefoonnummers:

- dr. Puls 014 21 82 16
- dr. Sebrechts 0486 72 40 30

## Een dagje in het ziekenhuis



## VERWIJDEREN VAN KEELAMANDELEN (TONSILLECTOMIE)

pediatrie  
AZH

AZH  
azherentals

versie mei 2016